

## **PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA**

### **Angin-Heel S, tablety** Homeopatický léčivý přípravek

Léčivé látky: Hydrargyri cyanidum D8 30,0 mg, Phytolacca decandra D4 30,0 mg, Apis mellifica D4 30,0 mg, Arnica montana D4 30,0 mg; Calcii sulfidum D6 60,0 mg, Solanum dulcamara D4 60,0 mg, Belladonna D4 60,0 mg.

**Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.**

**Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.**

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

**Co naleznete v této příbalové informaci**

- 1. Co je přípravek Angin-Heel S a k čemu se používá**
- 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Angin-Heel S užívat**
- 3. Jak se přípravek Angin-Heel S užívá**
- 4. Možné nežádoucí účinky**
- 5. Jak přípravek Angin-Heel S uchovávat**
- 6. Obsah balení a další informace**

### **1. CO JE PŘÍPRAVEK ANGIN-HEEL S A K ČEMU SE POUŽÍVÁ**

Kombinovaný přípravek **Angin-Heel S** je homeopatická specialita. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte dle rady odborníka na homeopatii.

### **2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ANGIN-HEEL S UŽÍVAT**

**Neužívejte přípravek Angin-Heel S**

- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky, na rostliny z čeledi hvězdnicovitých (*Asteraceae*), nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

**Upozornění a opatření**

Před použitím přípravku Angin-Heel S se poradte se svým lékařem nebo lékárníkem.

**Další léčivé přípravky a přípravek Angin-Heel S**

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

**Těhotenství a kojení**

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

### **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Přípravek Angin-Heel S nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

**Přípravek Angin-Heel S obsahuje 300 mg monohydrátu laktosy v jedné tabletě.** Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento homeopatický přípravek užívat.

### **3. JAK SE PŘÍPRAVEK ANGIN-HEEL S UŽÍVÁ**

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek je určen k vnitřnímu užití.

Dávkování: obvykle 3x denně 1 tableta, při akutních potížích lze užít 1 tabletu každých 15 minut po dobu 2 hodin. Tablety se užívají 15-20 minut před jídlem a nechají se rozpustit pod jazykem.

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obraťte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

### **4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V ojedinělých případech se může vyskytnout zvýšená salivace (slinění).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 10041, Praha 10, webové stránky: [www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.cz](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.cz).

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

### **5. JAK PŘÍPRAVEK ANGIN-HEEL S UCHOVÁVAT**

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

### **6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE**

**Co přípravek Angin-Heel S obsahuje**

Léčivými látkami jsou:

Hydrargyri cyanidum D8 30,0 mg, Phytolacca decandra D4 30,0 mg, Apis mellifica D4 30,0 mg, Arnica montana D4 30,0 mg; Calcii sulfidum D6 60,0 mg, Solanum dulcamara D4 60,0mg, Belladonna D4 60,0 mg.

Pomocnými látkami jsou: magnesium stearát, monohydrát laktosy.

**Jak Angin-Heel S vypadá a co obsahuje toto balení**

Angin-Heel S jsou bílé až slabě nažloutlé, hladké, kulaté tablety se zkosenými hranami, bez zápachu. Bílý polypropylenový obal na tablety s polypropylenovým uzávěrem.

Velikost balení: 50, 250, 750 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

**Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. Reckeweg-Str. 2- 4

76532 Baden-Baden, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Dr. Peithner Prag s.r.o.

Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4

Tel: 241740540

Email: office@peithner.cz

**Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24.6.2015.**